



ເຫັນພິບ

เห็ดพิษ (Mushroom poisoning) พบมากทั่วโลกตามความถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ โดยเฉพาะภัยทางด้านอาหาร เช่น เห็ดพิษชนิดหนึ่ง ชื่อ "แมลงกระเรื้อง" ที่มีสารพิษอยู่ในตัว ทำให้คนที่กินแล้วเสียชีวิตได้ จึงเป็นภัยคุกคามที่สำคัญมาก ควรระวังและไม่กินหากสงสัยว่าเป็นเห็ดพิษ

ตัวอย่าง ภาพเห็ดพิษและเห็ดกินได้

การจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ส้านนา จ. บ้าน

ปัจจัยเสี่ยงในการบริโภคเห็ด



เหตุระเบิดที่บ้านพ่อพิษ ! *ความร้อนฝนมีสามารถทำลายพิษได้*

วิธีการตรวจสอบเบื้องต้น (เบื้องต้น) ในเบื้องต้น โดยการผ่าซี่ส่วนของก้านหัวใจ หากมีสีเขียวจะดี แต่ใน แต่ใน แสดงว่าเป็นเบื้องต้น และหากมีลักษณะกลวง 脾胃 แสดงว่าเป็นเบื้องต้น ดังภาพ



ລັກຫະນະຂອງເກີດທີ່ຄວາມລົຶກເລື່ອງ



อาการหลังรับประทานเห็ดพิษ

ເຫັດມີພິບໄມ່ຮນແຮງ



คลีนไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว
เกิดภายใต้ไข้กินหน้ากากเต้มไม่เกิน 4 ชั่วโมง
ส่วนใหญ่หายเองได้เมื่อได้รับการรักษา

เห็ดมีพิษรนแรง



ตับราย ไตราภัย ชักรุนแรงต่อเนื่อง หมุดสติ และเสียชีวิตได้ เกิดอาการ 4 ชั่วโมงขึ้นไป หลังรับประทานเห็ด

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น



ลดการดูดซึมพิษ โดยให้เด็กผงถ่านกัมมันต์ 50 g.
ละลายน้ำเปล่า (ผงถ่านกัมมันต์ 1 g. ต่อน้ำหนักตัว
ประมาณ 1 kg.) *ถ้าหายดีแล้วให้ลดลง